

## **ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA**

- Caso use medicamentos anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários (como ácido acetilsalicílico, clopidogrel, ticlopidina, dabigatrana e outros) devem ser suspensos pelo menos 5 dias antes do exame.
- Na noite anterior ao seu exame fazer uma refeição leve.
- Jejum de 12:00 horas (inclusive água) antes do exame.
- Vir acompanhado por pessoa adulta, pois após o exame não poderá dirigir. Se possível não traga crianças.
- Vestir-se com roupa confortável e sapato sem salto ou salto baixo.
- Reserve para este procedimento aproximadamente 03 horas.
- Chegar à clínica com 10 minutos de antecedência.
- Informe qualquer alergia a drogas, doenças importantes (Ex: pulmonar, cardíaca) que necessite atenção especial durante o procedimento.
- Caso não possa comparecer ao horário agendado, favor desmarcar com pelo menos 24 horas de antecedência.
- Liberar as guias dos exames junto ao seu convênio antecipadamente.

### **SOBRE SEUS MEDICAMENTOS**

É importante informar ao seu médico e aos médicos endoscopistas que farão seu exame sobre:

- Alergia a medicamentos;
- Problemas nas válvulas do coração, pois haverá necessidade do uso de antibiótico profilático. Informe nossas recepcionistas assim que chegar na clínica para realizar o exame;

Interromper os seguintes Medicamentos para realização do exame:

- ANTICOAGULANTES (ASS, XARELTO, CLOPIDROGUEL, E OUTROS...) que são medicamentos para afinar o sangue (antiagregantes ou anticoagulantes); devem ser suspensos pelo menos 7 dias antes do exame pelo médico que prescreveu tais medicamentos;
- VICTOZA/SAXENDA (LIRAGLUTIDA) não tomar por 5 dias
- OZEMPIC/TRULICITY (SEMAGLUTIDA/DULAGLUTIDA) não tomar por 15 dias
- Medicamentos que está utilizando (traga anotado para não esquecer).

### **ENDEREÇO**

R. da Paz, 156 - Centro Curitiba - PR, 80060-160

### **TELEFONE**

(41) 3263-4474 ou Whatsapp: (41) 99698-5011

### **EMAIL**

adm@iadcuritiba.com.br