

PREPARO PARA RETOSSIGMOIDOSCOPIA

Período da Manhã e Tarde

O QUE É RETOSSIGMOIDOSCOPIA?

É um procedimento que permite o exame do ânus, reto e porção distal do intestino grosso (cólon), através de instrumentos endoscópicos introduzidos através do ânus.

PREPARO PARA RETOSSIGMOIDOSCOPIA

A remoção de fezes do intestino grosso é fundamental para a realização do exame. Caso o cólon não esteja adequadamente limpo o exame poderá ser suspenso. Por isso, siga as orientações abaixo. Os medicamentos listados poderão ser obtidos nas farmácias.

DIA ANTERIOR AO EXAME

- DIETA: Nesse dia está proibido a ingestão de bras (verduras, legumes, frutas, pão ou cereais integrais), carnes, leite e derivados. Alimentos permitidos: Caldo de carne coado, sopa de macarrão, miojo, ovos cozidos, torradas, gelatinas claras, sucos de frutas de cor clara e peneirados, chás, refrigerantes, água de coco. Continue tomando líquidos claros até 6 horas antes do exame.

- Tome 2 comprimidos de Dulcolax às 8:00h e outros 2 comprimidos às 18:00h. Se tiver cólicas, tome 40 gotas de Buscopan.

DIA DO EXAME

DIETA: Deverá permanecer em jejum absoluto (inclusive água) nas 6 horas que antecedem o exame.

MEDICAMENTO: PHOSFOENEMA ou FLEET ENEMA (utilizados para lavagem do reto). Aplicar o líquido de uma bisnaga no reto 1 hora antes de sair de casa para realizar o exame. Siga orientações da bula.

ROUPAS: use roupas e sapatos confortáveis no dia do exame.

SOBRE SEUS MEDICAMENTOS

É importante informar ao seu médico e aos médicos endoscopistas que farão seu exame sobre:

- Alergia a medicamentos;
- Problemas nas válvulas do coração, pois haverá necessidade do uso de antibiótico profilático. Informe nossas recepcionistas assim que chegar na clínica para realizar o exame;

Interromper os seguintes Medicamentos para realização do exame

- ANTICOAGULANTES (ASS, XARELTO, CLOPIDROGUEL, E OUTROS...) que são medicamentos para afinar o sangue (antiagregantes ou anticoagulantes); devem

ser suspensos pelo menos 7 dias antes do exame pelo médico que prescreveu tais medicamentos;

- VICTOZA/SAXENDA (LIRAGLUTIDA) não tomar por 5 dias
- OZEMPIC/TRULICITY (SEMAGLUTIDA/DULAGLUTIDA) não tomar por 15 dias
- Medicamentos que está utilizando (traga anotado para não esquecer).

ENDEREÇO

R. da Paz, 156 - Centro Curitiba - PR, 80060-160

TELEFONE

(41) 3263-4474 ou Whatsapp: (41) 99698-5011

EMAIL

adm@iadcuritiba.com.br